

Світч

Переваги застосування фунгіциду Світч:

- Забезпечує високоефективний захист овочів і ягід від гнилей.
- Не змивається дощем, ефективний при будь-яких погодних умовах.
- Швидко поглинається культурою та має тривалий захисний період.
- Відсутні обмеження щодо подальших культур у сівозміні.
- Не спричиняє розвиток резистентності та фітотоксичності.

Особливості використання фунгіциду Світч:

Фунгіцид Світч ВДГ спеціально створений для захисту сільськогосподарських культур від сірої гнилі та вторинних гнилей. Він може діяти на всіх етапах розвитку патогенів та створювати бар'єр проникнення їх всередину рослин. Після обробки фунгіцидом, плоди зберігаються довше, оскільки захищені від спор патогенів, які можуть потрапити на них.

Застосовується Світч ВДГ шляхом оприскування і має тривалий захисний ефект до 21 дня. Дія фунгіциду починається негайно після внесення, і його ефективність не залежить від погодних умов або температури, а також стійка до змивання дощем.

Фунгіцид Світч ВДГ віднесений до 3 класу небезпеки і має обмеження на ручні та механізовані роботи - до 3 діб. При дотриманні рекомендацій виробника, він дбайливо впливає на культуру, але не підходить для авіаційного оприскування та обробки біля водойм. Фітотоксичність не виявлена.

Цей пестицид можна використовувати в бакових сумішах з іншими засобами захисту рослин, які вносяться в одні терміни.

Рекомендується перевіряти сумісність кожного пестициду з Світч ВДГ перед використанням.

Інструкція по застосуванню і норми витрат фунгіциду Світч:

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг / га	Кратність обробок / термін очікування
ГРУША, ЯБЛУНЯ, ПЕРСИК, АБРИКОС, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ	Хвороби плодів під час їх зберігання в сховищах, парша, альтернаріоз, коккомікоз	Обприскування в період вегетації до збирання врожаю	0,75-1,0	1/15
АБРИКОС, ПЕРСИК, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ, ГРУША	Моніліоз, сиза цвіль гніль, фузаріозна гніль, альтернаріоз, сіра гніль, клястероспоріоз	Обприскування в період вегетації		2/20
ПОЛУНИЦЯ	Сіра гніль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса	Обприскування в період вегетації: перед цвітінням	0,75	2/7
		Після масового цвітіння	0,75-1,0	
Чорниця Садова (лохина)	Антракноз, Моніліоз, плямистості, хвороби ягід під час зберігання	Після масового цвітіння	0,75-1,0	
ВИНОГРАДНИКИ	Сіра гніль, мілдью	Обприскування в період вегетації	0,75-1,0	1-2/7
Томати і огірки відкритого і закритого ґрунту	Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра і сіра гнилі)			2/10

Купити комплекти:

+38 (044) 338 28 03

+38 (066) 576 63 91

+38 (096) 935 73 95