

## **Топаз фунгіцид**

Системний фунгіцид Топаз від компанії Сінгента застосовується на посівах різних сільськогосподарських культур овочевого та плодово-ягідного типу для лікування та профілактики широкого спектру грибкових захворювань. Препарат містить у складі діючу речовину пенконазол, яка швидко проникає в рослину, зупиняє ріст зооспор грибів та захищає рослину від повторного зараження. Фунгіцид Топаз ефективно застосовується для лікування винограду, вишні, малини, огірків, персика, полуниці, чорної смородини, яблуні від оїдіуму, кокомікозу, пурпурової плямистості (дидимели), сірої гнилі, борошнистої роси, плодової гнилі, американської борошна.

### **Переваги препарату Топаз:**

- Фунгіцид Топаз можна застосовувати в комплексі з іншими препаратами.
- Засіб має тривалий період захисної дії до 2 тижнів.
- Фунгіцид стійкий до змиву опадами та підвищеними температурами.
- Препарат не завдає шкоди оброблюваним культурам, є безпечним для рослин та навколишнього середовища.
- Системна дія фунгіциду сприяє захисту всієї поверхні рослини.
- Фунгіцид Топаз економічний завдяки низьким нормам витрати.
- Діюча речовина: пенконазол 100 г/л.

Завдяки системній дії препарату Топаз, діюча речовина переміщується по рослині акропетально, трансламінарно та базипетально. За рахунок швидкого засвоєння рослиною (30 хв.), препарат має виражений стоп-ефект і лікувальні властивості, навіть якщо зараження відбулося за три дні до внесення препарату. Високоєфективний проти чорної, аспергільозної та чорної пліснеподібної гнилі ягід винограду.

Рекомендована норма витрати робочого розчину:

Культура	Захворювання	Норма витрати	Строк очікування (кратність обробок)
Виноград	Оїдіум	9-15 мл/10 л води. Обприскування при появі перших ознак захворювання з інтервалом 10-14 днів	20(4)
Гвоздика ремонтантна відкритого і захищеного ґрунту	Іржа	9 мл/10 л води. Обприскування в період вегетації	3(3)
Огірки відкритого та закритого ґрунту, суниця, персик	Борошниста роса, плодова гниль	6 мл/10 л води. Обприскування в період вегетації	20(4)
Троянди відкритого і захищеного ґрунту, горшкові, квіткові	Борошниста роса, іржа	6 мл/10 л води. Обприскування в період вегетації	3(3)
Смородина чорна, агрус	Американська борошниста роса	9 мл/10 л води. Обприскування при появі перших ознак захворювання з інтервалом 10-14 днів.	20(4)

**Купити комплекти:**

**+38 (044) 338 28 03**

**+38 (066) 576 63 91**

**+38 (096) 935 73 95**